

Överläkare Barbro Dahlén, lung-allergikliniken 17 december, 2009

Läkemedel mot värk och inflammation som ej får användas vid överkänslighet mot acetyl-salicylsyra och värkmediciner med liknande effekt (s.k. icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel, eller "NSAID-preparat").

Nedan ges exempel på preparatnamn. Inom parentes anges namn på det kemiska ämnet.

Albyl, Alka-Seltzer, Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Migpriv, Treo, Trombyl
(*acetylsalicylsyra*)

Confortid, Indomee (*indometacin*)

Clinoril (*sulindak*)

Diklofenak, Eeze, Voltaren, Arthrotec (*diklofenak*)

Toradol (*ketorolak*)

Brexidol, Piroxikam (*piroxikam*)

Alganex (*tenoxikam*)

Xefo (*lornoxikam*)

Mobic, Meloxikam (*meloxikam*)

Alindrin, Brufen, Ibumetin, Ipren, Ardinex (*ibuprofen*)

Alpoxen, Eox, Naprosyn, Naproxen, Pronaxen (*naproxen*)

Ketoprofen, Orudis, Siduro (*ketoprofen*)

Tradil (*dexibuprofen*)

Celebra, Bextra, Dynastat, Arcoxia, Prexige (närbesläktad grupp av inflammationsdämpande värkmediciner s.k. "coxiber")